

Altacet 1 g, 6 tabletek stłuczenia okładady siniaki

cena: 12,49 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Tabletki
Producent	glaxosmithkline
Rejestracja	lek
Substancja czynna	aluminii acetatartas
Zastosowanie	Ból

Opis produktu

Substancja czynna: aluminium acetotartaricum

Skład

Jedna tabletkę zawiera 1 g glinuocetanowinianu (Aluminii acetat tartras).

Dawkowanie

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do sporządzania roztworu do stosowania na skórę.

Jedną tabletkę produktu Altacet należy rozpuścić w 50 ml (około ¼ szklanki) ciepłej, przegotowanej wody. Tak sporządzony roztwór stosować do okładów, kompresów i opatrunków.

Okłady, kompresy i opatrunki należy stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, aby nie dopuścić do ich wyschnięcia. Przed każdym użyciem należy przygotować świeży roztwór. Niezużyty roztwór należy wylać.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

U dzieci w wieku od 3 do 6 lat można stosować 1 okład w ciągu doby.

Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:



- doustnie;
- w przypadku nadwrażliwości na octanowinian glinu lub naktórkółwiek substancję pomocniczą;
- na otwarte, rozległe lub sączące się rany;
 - na zmienioną chorobowo skórę;
- u dzieci w wieku poniżej 3 lat;
- długotrwałe.

Zawartość:

Bliстер z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku zawiera 6 tabletek.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ

Pozwolenie: MZIOS R/0521

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu roztworu z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub zmian na skórze należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu leczniczego do okładów na piersi, gdyż grozi to szkodliwym działaniem na organizm niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego stosowanego zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem użycia.

Pożknięcie tabletki lub wypicie roztworu uzyskanego po rozpuszczeniu tabletki w wodzie może spowodować zatrucie. Toksyczność przyjętych doustnie tabletek lub roztworu powstałego po ich rozpuszczeniu może być również spowodowana przez kwas borowy zawarty w produkcie leczniczym. Objawy ostrego zatrucia mogą przypominać zatrucie wywołane kwasami: ból żołądka, nudności, wymioty śluzowe lub krwawe, biegunka. Mogą również wystąpić: senność, skurcze mięśni twarzy i kończyn, drgawki, gorączka, żółtaczka, skąpomocz lub bezmocz, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść, ubytki w błonie śluzowej żołądka. Większość zatruc może przebiegać bez ciężkich objawów.

Leczenie polega na podaniu dużej ilości wody z węglem aktywowanym, a następnie wywołaniu wymiotów. Jeśli stan pacjenta tego wymaga, dalsze leczenie powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.

Interakcje z innymi lekami

Nie są znane.



Działania niepożądane

Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych. W przypadku stosowania na duże powierzchnie skóry lub długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy maceracji skóry.