

Bilastyna Hitaxa 20 mg, 10 tabl alergologia nowość

cena: 12,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	20 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ADAMED SP.Z O.O.
Rejestracja	lek
Substancja czynna	Bilastinum
Zastosowanie	Alergia

Opis produktu

Czym jest lek Bilastyna Hitaxa?

Bilastyna Hitaxa to lek zawierający substancję czynną bilastynę działającą przeciwhistaminowo.

Bilastyna Hitaxa jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia.

Wskazania do stosowania leku Bilastyna Hitaxa

Objawy kataru siennego: kichanie, świąt, katar, zatkały nos, zaczerwienione i łzawiące oczy.

Inne postacie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Swędzące wysypki skórne (pokrzywka).

Substancja czynna: Bilastinum

Bilastyna Hitaxa - skład

Substancją czynną leku jest bilastyna. Każda tabletkę zawiera 20 mg bilastyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Dawkowanie leku Bilastyna Hitaxa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W



razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 12 lat i powyżej to 1 tabletką (20 mg) na dobę.

Tabletka do podawania doustnego.

Tabletkę należy przyjmować jedną godzinę przed lub dwie godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu soku owocowego.

Tabletkę należy połączyć popijając szklanką wody.

Linia podziału na tabletkę służy jedynie do ułatwienia przełamania tabletki, jeśli pacjent ma trudności z połyknięciem jej w całości.

Bilastyna Hitaxa u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Bilastyna Hitaxa - przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na bilastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

10 tabletek

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADAMED PHARMA S.A.

Pozwolenie: MZ 27097

Ważne przed zastosowaniem

Bilastyna Hitaxa - ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują umiarkowane do ciężkich zaburzenia czynności nerek i pacjent przyjmuje inne leki.

Nie należy stosować leku Bilastyna Hitaxa przez okres dłuższy niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i jest określany przez lekarza.

Bilastyna Hitaxa a ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania bilastyny u kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zdecyduje, czy można stosować Bilastyna Hitaxa w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów

Wykazano, że przyjmowanie bilastyny w dawce 20 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów u osób dorosłych. Jednak odpowiedź na leczenie u każdego pacjenta może być inna. Dlatego przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie



maszyn należy sprawdzić swoją reakcję na lek.

Przedawkowanie

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Bilastyna Hitaxa należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku lub ulotkę.

Bilastyna Hitaxa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregośkolwiek z poniższych leków:

ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

erytromycyna (antybiotyk)

diltiazem (lek stosowany w chorobie wieńcowej)

cyklosporyna (lek stosowany w celu zmniejszenia aktywności układu odpornościowego, co pozwala uniknąć odrzucenia przeszczepu lub zmniejszyć stopień nasilenia objawów w przebiegu chorób autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów)

rytonawir (w leczeniu AIDS)

ryfampicyna (antybiotyk)

Działania niepożądane leku Bilastyna Hitaxa

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznych (częstość nieznana), w tym: trudności w oddychaniu, zawroty głowy, zapaść lub utrata świadomości, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i (lub) obrzęk i zaczerwienienie skóry, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane, które mogą występować u dorosłych i młodzieży to:

Często: występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

bóle głowy

senność

Niezbyt często: występujące częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów

nieprawidłowy zapis EKG

zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby

zawroty głowy

ból żołądka

zmęczenie

wzmożony apetyt

zaburzenia rytmu serca



zwiększenie masy ciała
nudności
lęk
uczucie suchości lub dyskomfortu w nosie
ból brzucha
biegunka
zapalenie żołądka
zawroty głowy (zawroty lub uczucie wirowania)
osłabienie
wzmoczone pragnienie
duszność (trudności w oddychaniu)
suchość w jamie ustnej • niestrawność
świąd
opryszczka na twarzy
gorączka
szumy uszne (dzwonienie w uszach)
zaburzenia snu
zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności nerek
podwyższone stężenie lipidów we krwi.
Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych
kołatanie serca (uczucie bicia serca)
częstoskurcz (szybkie bicie serca)
wymioty.
Działania niepożądane, które mogą występować u dzieci, to:
Często: występujące rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
zapalenie błony śluzowej nosa (podrażnienie nosa)
alergiczne zapalenie spojówek (podrażnienie oczu)
ból głowy
ból żołądka (ból brzucha, ból w nadbrzuszu).
Niezbyt często: występujące rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów



podrażnienie oczu
zawroty głowy
utrata przytomności
biegunka
nudności
obrzęk warg
wyprysk
pokrzywka
zmęczenie.

Parametry

Wybierz moc	20 mg (0,00 PLN)
-------------	------------------