

Daktarin, 20 mg/g, krem, 15 g lek grzybica LEK

cena: 25,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	15 g
Postać	Krem
Producent	MCNEIL
Rejestracja	lek
Zastosowanie	Grzybica

Opis produktu

Daktarin Krem 20mg/g 15g

Wskazania:

Daktarin, krem jest wskazany w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak:

grzybica głowy,
tułowia,
rąk,
grzybica pachwin,
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca).

W związku z przeciwbakteryjnym działaniem leku Daktarin, krem może być on stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Właściwości:

Krem Daktarin to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania w przypadku grzybiczych zakażeń skóry, takich jak grzybica głowy, tułowia, rąk, pachwin czy grzybica międzypalcowa stóp ("stopa sportowca"). Ze względu na antybakteryjne działanie może być on stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Lek Daktarin, krem zawiera substancję czynną mikonazol. Mikonazol działa przeciwgrzybiczo między innymi na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych. Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez dermatofity i drożdżaki. Świąd ustępuje przed pojawieniem się innych oznak wyleczenia.



Składniki:

Substancją czynną leku jest mikonazolu azotan. 1 g kremu zawiera 20 mg mikonazolu.

Inne składniki to butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), parafina ciekła, makroglicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu stearynian, woda oczyszczona.

Stosowanie:

Lek Daktarin, krem stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na dobę.

W przypadku, gdy Daktarin, krem jest stosowany jednocześnie z lekiem Daktarin, puder leczniczy, zaleca się stosowanie obu postaci leku raz na dobę.

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.

Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 1 tygodnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.