


# Debutir, 10 czopków regeneracja błony śluzowej odbytu

cena: 24,99 PLN



## Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	10 sztuk
Postać	czopki
Producent	Polpharma
Rejestracja	wyrób medyczny
Zastosowanie	Trawienie

## Opis produktu

Debutir, 10 czopków

Czym są czopki Debutir?

Debutir czopki to wyrób medyczny, który jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Działa wspomagająco w regeneracji w obrębie błony śluzowej odbytnicy.

Działanie czopków Debutir

Czopek wprowadzony do kanału odbytu, po zetknięciu ze śluzem wytwarzanym fizjologicznie przez komórki kubkowe błony śluzowej odbytu, wytwarza na powierzchni błony śluzowej ochronną powłokę o właściwościach mukoadhezyjnych. Stanowi to ochronę oraz poprawia nawilżenie błony śluzowej odbytu.

Debutir - skład

Maślan sodu, alginian sodu, karboksymetyloceluloza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

Sposób użycia czopków Debutir

Przed aplikacją wyrobu należy umyć i osuszyć ręce. Czopek należy ostrożnie umieścić w kanale odbytu. Wprowadzenie czopka do odbytu najwygodniej jest wykonać w pozycji bocznej, leżącej, z lekko podkurczonymi nogami. Zaleca się aplikację czopka na noc. Po użyciu produktu, należy umyć ręce. Czopki doodbytnicze można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu w porozumieniu z lekarzem może być kontynuowane do 10 dni. Zaleca się stosować jeden czopek na dobę. Przerwa pomiędzy pierwszą a kolejną aplikacją czopka nie powinna być krótsza niż 24 godziny.

Przeciwwskazania do stosowania czopków Debutir



Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład czopków.

Zmiany nowotworowe odbytnicy.

Silny, ostry ból okolicy odbytu.

Krwawienie z odbytnicy samoistne lub przy wypróżnianiu, rozumiane jako występowanie jasnoczerwonej krwi na stolcu.

Debutir czopki - ostrzeżenia

Wyrób nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Nie stosować wyrobu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych.

W ciąży i w trakcie karmienia stosowanie wyrobu wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarskie.

Nie stosować w trakcie stosowania innych doodbytniczych wyrobów i leków bez porozumienia i konsultacji z lekarzem.

Nie stosować wyrobu Debutir dopochwowo.

Wyrób medyczny Debutir przeznaczony wyłącznie do stosowania doodbytniczego – nie spożywać wyrobu.

Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

10 czopków

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: DOC\*