

# DiosMax 1000 mg 60 tabl LEK żylaki nogi krążenie



cena: 41,99 PLN

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	1000 mg
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	Olimp
Rejestracja	lek
Substancja czynna	diosminum
Zastosowanie	Żylaki

## Opis produktu

### Czym jest i jak działa lek DiosMax?

DiosMax zawiera zmikronizowaną diosminę, należącą do grupy substancji zwanych bioflawonoidami. Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy oraz poprawia powrót krwi z układu żylnego oraz zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych. Diosmina zmniejsza też przepuszczalność małych naczyń krwionośnych – ogranicza stany zapalne, zwłaszcza w zapaleniach okołożyłnych. Poprzez przywrócenie naczyniom włosowatym prawidłowej przepuszczalności zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

### DiosMax - wskazania

Wskazania do stosowania DiosMax:

leczenie objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak: obrzęki, uczucie zmęczenia, ból i ciężkość nóg, pieczenie, nocne kurcze oraz poszerzanie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. „pajęczki”);  
objawowe leczenie żylaków kończyn dolnych;  
zaostrenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów).  
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: Diosminum

### DiosMax - skład

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletki zawiera 1000 mg diosminy w postaci zmikronizowanej. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka Opadry II Clear (alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk).

### Jak stosować lek DiosMax?

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W



razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych Zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę, podczas posiłku. W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni. Zaostrzenie dolegliwości związanych z żyłakami odbytu Zalecana dawka to 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. Jeśli objawy nasilią się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy nie należy stosować leku DiosMax?

Jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

60 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES

Pozwolenie: MZ 26242

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku DiosMax

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaostrzenie dolegliwości związanych z żyłakami odbytu

Należy pamiętać, że terapia lekiem DiosMax jest wyłącznie objawowa i powinna być ona krótkotrwała. Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego Jeżeli objawy choroby ulegają pogorszeniu w trakcie leczenia, tzn. obserwuje się stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenie skóry lub gdy występują nietypowe objawy, takie jak np. gwałtowny obrzęk jednej lub obu nóg, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Skuteczność terapii można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia tj. unikanie długotrwałej ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, redukcję nadwagi, kontrolowanie prawidłowej masy ciała, noszenie specjalnych pończoch uciskowych, aktywność fizyczną. DiosMax nie jest skuteczny w przypadku gdy obrzęki kończyn dolnych są spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DiosMax a interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować o stosowaniu:

metronidazolu (lek przeciwbakteryjny) – działanie metronidazolu może się nasilić,

diklofenaku (lek przeciwzapalny, przeciwbólowy) – działanie diklofenaku może się nasilić,

feksofenadyny (lek przeciwalergiczny) – działanie feksofenadyny może się nasilić,

karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy) – działanie karbamazepiny może się nasilić.

DiosMax a skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania. Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zaparcia), bóle i zawroty głowy.

W pojedynczych przypadkach na początku leczenia (przez pierwsze 4 dni) może wystąpić świąd lub pokrzywka.

Leki z diosminą, w większości przypadków są dobrze tolerowane, a wystąpienie któregośkolwiek z wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie powoduje konieczności odstawienia leku.