

Dolgit krem ból żółta ibuprofen p/zapalna 100 g

cena: 23,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	100 gram
Postać	Krem
Producent	Zdrovit
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	ibuprofen
Zastosowanie	Ból

Opis produktu

Opis

Co to jest Dolgit?

Krem Dolgit zawiera substancję Ibuprofen, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.

Dolgit krem stosuje się miejscowo w bólach mięśni, bólach towarzyszących w przebiegu chorób stawów, w bólach reumatycznych.

Wskazania

Dolgit krem jest wskazany do miejscowego leczenia reumatyzmu mięśniowego, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa, stanów zapalnych tkanek miękkich stawów np. kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniastych, więzadeł i torebek stawowych. Może być również stos. w bólach krzyża, w sztywności barku.

Substancja czynna: Ibuprofenum

Skład

Dolgit skład:

Substancją czynną leku jest ibuprofenem.

Pozostałe składniki triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearnian, makrogolo-30-glicerolu monostearnian, makrogolo-100-glicerolu monostearnian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoosan sodowy, gumaksantan, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Dolgit jak stosować?

Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę 3 do 4 razy na dobę pasek kremu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g kremu, co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu).

W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.

Wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest większe podczas zabiegów jonoforezy (rodzaj elektroterapii). Krem Dolgit stosuje się



pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm² powierzchni elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut. Czas trwania takiego leczenia ustala lekarz.

Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dawka dobową nie powinna przekraczać 12 g kremu (600 mg ibuprofenu).

Przeciwwskazania

Preparat Dolgit krem nie może być stosowany na błony śluzowe i otwarte rany. Nie jest wskazany do leczenia dzieci do 14 roku życia.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 100 g kremu.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: DOLORGIET

Pozwolenie: MZ 6443

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Dolgit krem nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie.

W razie wystąpienia wysypki lek należy odstawić.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym nałożeniu leku należy umyć ręce.

Dolgit zawiera glikol propylenowy i metylu parahydroksybenzoesan sodowy.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu sodowego lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Dolgit w ciąży:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Dolgit w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

W I i II trymestrze leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry ani przez długi czas.

Nie należy stosować leku Dolgit w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane

Dolgit działania niepożądane:

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić objawy niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu, wyjątkowo przy stosowaniu miejscowym. Jeżeli wystąpią poniższe objawy niepożądane, lek należy odstawić:

niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs;

zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania);

astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność;

wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica;

choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy);

niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek;

ból brzucha, niestrawność.

Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.