

Duphalac 150 ml 1 szt syrop przeczyszczające jelita



cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	150 ML
Postać	syrop
Producent	MYLAN
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	Zioła

Opis produktu

Opis
Duphalac jest lekiem przeczyszczającym o działaniu osmotycznym, zawierającym jako substancję czynną laktulozę.

Lek zmiękcza stolec i ułatwia jego przemieszczanie powodując przenikanie wody do jelita. Działanie to stymuluje perystaltykę okrężnicy i prowadzi do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca, dzięki czemu dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego.

Wskazania
Kiedy stosuje się Duphalac?

Duphalac stosowany jest w leczeniu zaparcia (spowolnione ruchy jelit, twarde i suche stolce) oraz w celu zmiękczenia stolca np.:

jeśli występują hemoroidy (żylaki odbytu)
po operacjach w okolicach odbytu lub w obrębie jelita grubego
Duphalac stosowany jest również w leczeniu encefalopatii wątrobowej (choroba wątroby powodująca splątanie, drżenie, obniżony poziom świadomości, w tym śpiączkę).

Substancja czynna: Lactulosum

Skład
Duphalac skład:
Substancja czynna 1 ml leku Duphalac zawiera 667 mg laktulozy.
Pozostałe składniki woda oczyszczona. Lek może zawierać cukry takie jak laktoza, galaktoza i fruktoza, jako pozostałość z procesu syntezy.

Duphalac może zawierać siarczyny, jako pozostałość z procesu syntezy.

Dawkowanie
Duphalac należy przyjmować o tej samej porze dnia.



Lek należy szybko połknąć. Nie należy przetrzymywać leku w ustach.
Duphalac może być przyjmowany nierozcieńczony lub rozcieńczony w pewnej ilości płynu.
W przypadku leku Duphalac w butelce można użyć załączonej miarki.
W przypadku leku Duphalac w saszetkach należy oderwać róg saszetki i natychmiast przyjąć zawartość.
Dawkowanie Duphalac w zaparciu lub przypadkach konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych:

Dawka może być podawana raz dziennie, np. w czasie śniadania, lub w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku leku Duphalac w butelce można użyć załączonej miarki.

Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.

Duphalac w butelkach lub saszetkach po 15 ml:

Dawka
początkowa dobową

Dawka
podtrzymująca dobową

Dorośli

15-45 ml

15-30 ml

Dzieci
(7-14 lat)

15 ml

10-15 ml

Dzieci
(1-6 lat)

5-10 ml

5-10 ml

Niemowlęta

do 5 ml

do 5 ml

Stosowanie Duphalac u dzieci

Leki przeczyszczające u dzieci, niemowląt i noworodków powinny być stosowane w szczególnych przypadkach i pod nadzorem lekarza, ponieważ mogą zaburzać naturalny odruch oddawania stolca.

Nie należy podawać leku Duphalac dzieciom (< 14 lat) bez konsultacji z lekarzem, który zaleci lek i zapewni nadzór leczenia.

Dawkowanie w encefalopatii wątrobowej (tylko u dorosłych):

Dawka początkowa w encefalopatii wątrobowej wynosi 30-45 ml (2-3 saszetki) 3-4 razy dziennie.



Dawkowanie może zostać zmodyfikowane do dawki podtrzymującej tak, aby pacjent oddawał od 2 do 3 miękkich stolców dziennie.

Duphalac z jedzeniem i pić:

Duphalac może być przyjmowany z jedzeniem lub bez. Nie ma ograniczeń dotyczących przyjmowanego jedzenia lub picia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Duphalac?

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na

laktulozę

lub którykolwiek z pozostałych składników leku Duphalac.

Jeśli u pacjenta występuje:

galaktozemia (ciężka choroba genetyczna uniemożliwiająca trawienie galaktozy)

niedrożność przewodu pokarmowego (oprócz normalnego zaparcia)

perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Duphalac.

Zawartość:

Duphalac występuje w postaci roztworu doustnego, który jest klarownym, lepkim płynem, bezbarwnym do brązowawo-żółtego.

Opakowanie zawiera 150 ml roztworu.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MYLAN

Pozwolenie: MZIOS R3048

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Duphalac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent cierpi na jakiegokolwiek choroby, a w szczególności:

jeśli u pacjenta występuje niewyjaśniony ból brzucha

jeśli pacjent nie trawi cukru mlecznego (laktozy)

jeśli występuje cukrzyca.

Nie należy przyjmować leku Duphalac jeśli występuje:

nietolerancja galaktozy lub fruktozy

niedobór laktazy typu Lapp

złe wchłanianie glukozy-galaktozy.

U pacjentów z cukrzycą i jednocześnie leczonych z powodu encefalopatii wątrobowej dawka leku Duphalac będzie większa. Ta duża dawka może zawierać dużą ilość cukru. Z tego powodu może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.

Przewlekłe przyjmowanie niedostosowanych dawek (pojawienie się powyżej 2-3 miękkich stolców na dobę) lub nadużywanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń elektrolitowych.



W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 2 l/dobę, tj. 6-8 szklanek).

W przypadku przyjmowania leku Duphalac przez kilka dni i braku poprawy lub nasilenia się objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Duphalac może zawierać bardzo małe ilości cukru mlecznego (laktoza), galaktozy, epilaktozy lub fruktozy.

Ciąża i laktacja
Duphalac w ciąży:

Duphalac może być przyjmowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie przewiduje się wpływu na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Duphalac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie przyjmowania leku Duphalac zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10)

biegunka

Często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 10)

wzdęcia

nudności

wymioty

bóle brzucha

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100)

zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki

W ciągu pierwszych kilku dni leczenia mogą pojawić się wzdęcia. Z reguły ustępują po kilku dniach.

W przypadku zastosowania dawek większych niż zalecane mogą wystąpić ból brzucha i biegunka. W takim przypadku dawkę należy zmniejszyć.

W przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy okres czasu (zwykle tylko w leczeniu encefalopatii wątrobowej) u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej z powodu biegunki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.