


Esberitox N, 100 tabl odporność infekcje

cena: 49,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	INNE
Rejestracja	lek
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	odporność

Opis produktu

Czym jest Esberitox N i jakie ma działanie?

Esberitox N jest roślinnym lekiem wykazującym działanie pobudzające układ odpornościowy, skracającym czas infekcji i łagodzącym jej przebieg. W składzie znajdują się wyciągi z ziele żywotnika zachodniego (*Thujae occidentalis herba*), korzenia jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae radice*) i korzenia dzikiego indygo (*Baptisiae tinctoriae radice*). W badaniach klinicznych u ludzi Esberitox N łagodził objawy i skracał czas trwania choroby w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych.

Esberitox N wskazania

Esberitox N stosuje się w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Substancja czynna: *Baptisiae tinctoriae radix*, *Echinaceae purpureae radix*, *Thujae occidentalis herba*

Esberitox N skład

Substancją czynną leku jest wyciąg z: ziele żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia dzikiego indygo - *Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba) (1:11)*, ekstrahent: etanol 30% (v/v.)
1 tabletkę Esberitox N zawiera:

0,215 ml wyciągu odpowiadającego:

Baptisiae tinctoriae radice (korzeń dzikiego indygo) 10 mg

Echinaceae purpureae radice (korzeń jeżówki purpurowej) 7,5 mg

Thujae occidentalis herba (ziele żywotnika zachodniego) 2 mg

Substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Działanie

- naturalny środek wzmacniający organizm



Esberitox N dawkowanie i przyjmowanie tabletek
Zalecana dawka leku Esberitox N to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.
Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.
U dzieci poniżej 12 lat przed zastosowaniem leku zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą. Można również rozpuścić tabletkę w ustach.
Jak długo stosować Esberitox N?

Okres stosowania leku zależy od leczonej choroby. Leczenie powinno być rozpoczęte tak szybko jak to tylko możliwe po pojawieniu się objawów i kontynuowane do ich ustąpienia. Nie należy stosować leku Esberitox N dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie Esberitox N u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 lat. Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Przed zastosowaniem tabletek Esberitox N u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnięcie porady lekarza.

Dawkowanie dorośli

- doustnie - 3 x dziennie 3 tabl. lub 3 x dziennie 50 kropli

Kiedy nie stosować leku Esberitox N

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ziele żywotnika zachodniego (*Thuja occidentalis herba*), korzeń jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae radice*), korzeń dzikiego indygo (*Baptisia tinctoriae radice*) lub na rośliny pokrewne do korzenia jeżówki, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (*Compositae/Asteraceae* – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

W przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza (choroba zapalna oddziałująca na tkankę łączną), stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne (wytwarzanie przeciwciał przeciw tkankom własnego organizmu).

W przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

U dzieci poniżej 4 lat.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 100 tabletek, ulotkę.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SCHAPER & BRUEMMER

Pozwolenie: MZ R/0130