

## Pedipur, puder płynny, 60 g



cena: 12,99 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	60 gram
Postać	puder
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	Sprzedaż internetowa

### Opis produktu

#### Opis

Pedipur ma postać pudru leczniczego. Metenamina, substancja czynna Pedipuru swoje działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

Pedipur działa wysuszająco, bakteriobójczo i ściągająco. Likwiduje przykry zapach potu.

#### Wskazania

Nadmierna potliwość skóry stóp i dłoni.

Substancja czynna: Methenaminum

#### Skład

Substancja czynna

Substancją czynną leku jest metenamina.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy

Pozostałe składniki

talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona

#### Dawkowanie

Lek Pedipur należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.



Produkt do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipur na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

#### Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu:

w nadwrażliwości na metenaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

na śluzówki,

na otwarte rany,

powierzchnie ciała pozbawione naskórka,

na owrzodzenia.

#### Zawartość:

Lek ma postać gęstej, nieprzezroczystej, białej zawiesiny pudru, o charakterystycznym zapachu metenaminy. Opakowanie zawiera 60 g.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL POZNAŃ

Pozwolenie: MZ R/3530

#### Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z lekarzem.

#### Ciąża i laktacja

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku Pedipur mogła stanowić zagrożenie dla płodu lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

#### Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Interakcje z innymi lekami

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, azotany), kwasami i solami o odczynie kwaśnym, węglany (magnezowy, wapniowy)

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, Pedipur może powodować działania niepożądane. Długotrwałe stosowanie Pedipur może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.