


PHLEBODIA 600MG 60TABLETEK krążenie żylaki ciężkie nogi



cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Dawka	600 mg
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	diosminum
Zastosowanie	kaszel

Opis produktu

Phlebodia - charakterystyka

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania leku Phlebodia

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

Substancja czynna: Diosminum

Skład leku Phlebodia

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletki zawiera 600 mg diosminy.

Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), celuloza mikrokrystaliczna. Otoczka: 1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400, stearynian. 2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), czerwien koszenilowa A, pąs 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172). 3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), воск Carnauba (E 903), воск pszczeli (E 901).

Jak dawkować Phlebodia?

Ten lek należy zawsze przyjmować według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku od 18 lat)

Zalecana dawka w:



niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletkę na dobę.
żylakach odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.
Sposób stosowania

Podanie doustne.

Należy połączyć tabletkę popijając połową szklanki wody.

Phlebodia u dzieci i młodzieży

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).

Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia?

jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

60 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: INNOTHERA

Pozwolenie: MZ 10202

Kod EAN: 5909991500351

Ważne przed zastosowaniem Phlebodia - ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Phlebodia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia

jeśli dyskomfort i łamliwość włosów nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem,
jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu utrzymują się po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
Środki ostrożności

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia.

Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, wysokich temperatur, długiego stania, nadwagi.

Noszenie odpowiednich pończoch uciskowych wspomaga prawidłowe krążenie krwi.

Lek Phlebodia zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (E 124)

Lek zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (barwnik azowy), który może powodować reakcje alergiczne.

Phlebodia w ciąży i podczas karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.



Phlebodia a prowadzenie pojazdów
Brak lub nieznaczny wpływ.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Phlebodia a inne leki

Istotnie klinicznie interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działania niepożądane leku Phlebodia

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

bóle żołądka

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy lub gardła

wzdęcia

biegunka

zaburzenia trawienia

mdłości

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

wymioty.

Zaburzenia trawienia rzadko prowadzą do zaprzestania leczenia.