

Proctomina, 10 czopków hemoroidy żylaki odbytu LEK

cena: 15,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 sztuk
Postać	czopki
Producent	FARMINA
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	hemoroidy

Opis produktu

Opis

Proctomina czopki zawierają sprawdzone substancje czynne w walce z hemoroidami. Zasadowy galusan bizmutu, tlenek cynku i tanina działają ściągająco i łagodząco na stan zapalny i podrażnienie błony śluzowej odbytu. Dodatkowo wykazują skuteczność w leczeniu dolegliwości takich jak ból i świąd towarzyszący chorobie hemoroidalnej.

Wskazania

Lek o działaniu ściągającym, stosowany w leczeniu dolegliwości takich jak: ból, świąd, towarzyszący chorobie hemoroidalnej (guzkom krwawniczym). Lek łagodzi stany zapalne oraz podrażnienia błony śluzowej odbytu.

Substancja czynna: Bismuthi subgallas, Tanninum, Zinci oxidum

Skład

1 czopek zawiera:

substancje czynne: 200 mg bizmutu galusanu zasadowego + 100 mg cynku tlenku + 150 mg taniny

substancja pomocnicza to tłuszcz stały

Dawkowanie

Lek Proctomina należy stosować doodbytniczo.

Dorośli: 1 czopek 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania



Nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników leku.

Zawartość:

10 czopków.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: FARMINA

Pozwolenie: MZ 23340

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Jeżeli wystąpi krwawienie z odbytu lub znaczne nasilenie dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Może wystąpić zmiana koloru kału na czarny ze względu na zawarty w produkcie zasadowy galusan bizmutu.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Interakcje z innymi lekami

Lek Proctomina może być stosowany równocześnie z lekami stosowanymi doustnie.

Stosowanie leku Proctomina może wpłynąć na wchłanianie innych leków stosowanych doodbytniczo. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Proctomina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej odbytu.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.