

Syrop prawoślazowy 125g ziołowa tradycja LEK kaszel powlekający



cena: 6,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	125 gram
Postać	syrop
Producent	HASCO
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	kaszel

Opis produktu

Opis

Syrop prawoślazowy to roślinny lek łagodzący kaszel, który towarzyszy podrażnieniom błony śluzowej gardła. Głównym składnikiem leku jest macerat z korzenia prawoślazu.

Skład

Substancją czynną jest macerat z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L., radix).

100 g syropu zawiera 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu).
Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1). Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 % (m/v).

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas benzoesowy (E 210).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Dorośli: 1 łyżkę 3 razy dziennie.

Wskazania

Syrop prawoślazowy to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent: jest uczulony na którykolwiek ze składników preparatu; ma astmę oskrzelową (ze względu na zawartość kwasu benzoesowego w składzie); ma nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed



przyjęciem leku - lek zawiera sacharozę,

Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W okresie ciąży oraz karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci do 6. roku życia.