

Syrop prawoślazowy Hasco, 125 g kaszel suchy



cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	125 G
Postać	syrop
Producent	HASCO
Rejestracja	lek
Substancja czynna	althaeae officinalis
Zastosowanie	kaszel

Opis produktu

Opis

Syrop prawoślazowy Hasco jest preparatem stosowanym tradycyjnie w celu łagodzenia suchego kaszlu w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Lek działa osłaniająco na błony śluzowe krtani i gardła.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Substancja czynna: *Althaeae radix*

Skład

100 g syropu zawiera:

35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L., radix) (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu). Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy.

Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1% (m/v).

Substancje pomocnicze: kwas benzoasowy 0,1 g, sacharoza 64,0 g.

Dawkowanie

Podanie doustne.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia - trzy razy na dobę po 15 ml.

Dzieci w wieku 6-12 lat: o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się trzy razy na dobę po 5 ml.



Do opakowania dołączona jest miarka.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień mimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu

Zawartość:

125 g

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZ IL-0692/LN

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej płwociny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,1m/v etanolu (alkoholu), tzn. do 186 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 4,7 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową. Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat.

Lek Syrop prawoślazowy a inne leki

Nie stwierdzono oddziaływań z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz zawartość alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań odnośnie wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Działania niepożądane nie są znane. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.