


## Tolep, plastry na odciski, 4 sztuki zestaw stopy LEK



cena: 5,19 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	4 sztuk
Postać	plastry
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	Pielęgnacja

### Opis produktu

#### Wskazania

Plaster na odciski jest wskazany do usuwania pojedynczych odcisków i modzeli.

Substancja czynna: Acidum salicylicum

#### Skład

Wykaz substancji pomocniczych: Lanolina, Wosk pszczeli biały, Żywica Staybelite Ester 10

Warstwa nośna: folia PE 1000x0,120mm, kółko z pianki PE

#### Dawkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub modzel. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Najlepiej zastosować lek na noc. Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją osuszyć. Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy, w ten sposób, aby "kółko" przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba końce plastra leczniczego dokładnie dookoła palca. Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 usunąć zmiękczony, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub mydlanej. W przypadkach uporczywych terapię można powtarzać co 48 godzin. Nie stosować dłużej niż przez 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej ilości leku niż zalecana, należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Plaster na odcisk.



#### Przeciwwskazania

Nie stosować:

w nadwrażliwości na substancję czynną - kwas salicylowy, lub którąkolwiek substancję pomocniczą (może wystąpić wysypka, podrażnienie skóry, uczulenie, kontaktowe zapalenie skóry),  
u pacjentów z zaburzeniami krążenia,  
u pacjentów z cukrzycą,  
u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby,  
jeśli modzeł, odcisk lub skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona, zmieniona lub zapalnie podrażniona.

Zawartość:

4 plastry w woreczku PE strunowym.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TOLEP

Pozwolenie: MZ/17129

Kod EAN: 5909990801763

#### Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy przerwać leczenie i usunąć plaster leczniczy, jeśli wystąpi stan zapalny skóry, podrażnienie lub uczulenie.

Plaster leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk - nie należy stosować plastra na niezmienną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Produkt leczniczy może powodować wystąpienie podrażnienia skóry i wypryski. Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami o błonami śluzowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na zawartość lanoliny, produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu keratolitycznym, takich jak mocznik, rezynoidy, oraz kwas mlekowy może spowodować silne złuszczenie się naskórka. Wchłanianie kwasu salicylowego przez skórę może być nasilone w obecności dimetylosulfoksydu (DMSO). Ciąża i laktacja: Nie prowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn w ruchu:

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości:

Wszelkie resztki nie wykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

#### Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Działania niepożądane

Może wystąpić podrażnienie, uczulenie i stan zapalny skóry.