

TroxeRutin Synteza 200 mg 64 kapsułki twarde krążenie żylaki LEK



cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	64 sztuki
Postać	kapsułki
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	krążenie

Opis produktu

Wskazania

TroxeRutin Synteza stosuje się w leczeniu objawów zaburzeń krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w kończynach dolnych z objawami ciężkości i bólu nóg, kurczów nocnych, żylaków oraz w łagodzeniu objawów związanych z obecnością żylaków odbytu (hemoroidów).

Substancja czynna: o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea

Skład

Skład: laktoza, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, laurylosiarczan sodu, erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), żelatyna.

Dawkowanie

Jak stosować lek TroxeRutin Synteza

Lek stosuje się doustnie.

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków. TroxeRutin przyjmuje się 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez okres 4 do 6 tygodni. Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii jeszcze przez kilka tygodni.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania leku. W razie zażycia znaczących ilości leku należy spowodować opróżnienie żołądka i zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku TroxeRutin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.



Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku Troxerutin Synteza.

Nie występują interakcje z innymi lekami lub substancjami pomocniczymi zawartymi w leku.

Zawartość:

Blistry z folii Aluminium/PVC w teksturowym pudełku. 64 kapsułki (4 blistry po 16 sztuk). Pojemnik z PE w teksturowym pudełku. 64 kapsułki w pojemniku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SYNTEZA

Pozwolenie: MZ 9651

Kod EAN: 5909990965113

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Troxerutin Synteza z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków.

Stosowanie leku Troxerutin Synteza u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Troxerutin Synteza nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Troxerutin Synteza

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Troxerutin Synteza może być stosowany z innymi lekami. Nie wpływa na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych. Lek ogranicza aktywność prokoagulacyjną osocza krwi.

Przechowywanie leku Troxerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Troxerutin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, Troxerutin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek jest dobrze tolerowany. Niezbyt często mogą wystąpić: świąd skóry, wysypka, przemijające nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zaburzenia



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

snu. Zaleca się zmniejszenie dawki lub okresowe odstawienie leku. Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość barwników w otoczce kapsułki.