

Urosan fix 20 saszetek Herbapol Lublin układ moczowy stan zapalny



cena: 8,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	20 sztuk
Postać	Saszetki
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	ukł moczowy

Opis produktu

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

- pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych

- pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu

Substancja czynna: Betulae folium, Cichorii radix, Equiseti herba, Vitis idaeae folium

Skład

1 saszetka 2,0 g zawiera:

Ziele skrzypu (Equiseti herba) 0,8 g

Liść brzozy (Betulae folium) 0,7 g

Korzeń podróżnika (Cichorii radix) 0,3 g



Liść borówki brusznicy (*Vitis idaeae folium*) 0,2 g
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzania, w saszetkach.

Sposób użycia

2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min.

Działanie

Moczopędnie.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu. Stosować przez okres 2-4 tygodni. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Przeciwwskazania

Uczulenie na składniki roślin z rodziny Asteraceae (Compositae) lub pyłek brzozy. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Uwagi do stosowania

Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Zawartość:

2 g x 20 torebek

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: MZIOS 2156

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy t.j.: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwimocz, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania w trakcie ciąży lub laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania w tym okresie.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje z innymi lekami

Nieznane.

Działania niepożądane

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Nie jest znana częstotliwość występowania. Ze względu na zawartość związków goryczowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.