

Vicks AntiGrip Complex 10 sasz grypa LEK APTEKA



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 10 sztuk |
| Postać | Saszetki |
| Producent | TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. |
| Rejestracja | lek |
| Substancja czynna | złożone |
| Zastosowanie | Przeziębienie |

Opis produktu

Czym jest Vicks Antigrip Complex?

Vicks AntiGrip Complex ma na celu łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

Lek zawiera trzy substancje czynne:

Paracetamol jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym. Jest skuteczny w bólu, w tym bólu głowy i bólu gardła oraz obniża gorączkę (działanie przeciwgorączkowe).

Gwajafenezyna (lek wykrztuśny) rozrzedza flegmę ułatwiając odkrztuszenie w mokrym kaszlu.

Fenylefryny chlorowodorek (lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk nosa i w ten sposób umożliwia jego udrożnienie.

Lek Vicks AntiGrip Complex należy przyjmować jedynie w razie, gdy u pacjenta występuje ból i (lub) gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel.

Jakie są wskazania do zastosowania Vicks Antigrip Complex?

Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy

Substancja czynna: Guaifenesinum, Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum

Skład

1 saszetka zawiera:



substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezynę 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg

substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminian, sodu cytrynian, aspartam (E951), acesulfam potasowy (E950), mentol w proszku, aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E104).

Jak stosować lek Vicks Antigrip Complex?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nie należy przyjmować leku z napojami alkoholowymi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podania:

Lek ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie do picia w postaci gorącego napoju. Wsypać jedną saszetkę proszku do kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia, a następnie wypić opalizujący, żółty roztwór o zapachu i smaku cytrusowo-mentolowym.

Czas trwania leczenia:

Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować Vicks AntiGrip Complex u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vicks AntiGrip Complex:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

jeśli u pacjenta występuje choroba serca

jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub ciężka choroba nerek

jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy

jeśli pacjent ma cukrzycę

jeśli pacjent ma jaskrę (podwyższone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania

jeśli pacjent ma porfirię, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzujące się nadmierną zawartością pigmentów w moczu

jeśli pacjent stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

jeśli pacjent stosuje leki beta-adrenolityczne

jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO) – stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona lub stosował je w



ciągu ostatnich 14 dni

jeśli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie krwi lub przeciw dławicy piersiowej.

Uwagi do stosowania

Vicks AntiGrip Complex zawiera:

Aspartam (E951), źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.

Sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sód (157 mg sodu na dawkę). Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 10 saszetek.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: WICK PHARMA

Pozwolenie: MZ 17297

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne: zawiera paracetamol. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W razie przedawkowania, pomimo dobrego samopoczucia pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w związku z ryzykiem opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Nie należy stosować leku z innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i przeciwkaszlowymi. Przed zastosowaniem leku Vicks AntiGrip Complex należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy:

u pacjenta występują problemy z czynnością wątroby

pacjent jest mężczyzną i ma powiększoną prostatę, co może powodować trudności z oddawaniem moczu

u pacjenta występują problemy z krążeniem (w tym zespół Raynauda)

u pacjenta występuje uporczywy lub przewlekły kaszel, jak u pacjentów palących tytoń, z astmą, z przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc

u pacjenta występuje ciężka niedokrwistość hemolityczna, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, przewlekłe zaburzenia odżywiania lub pacjent jest odwodniony.

Vicks Antigrip Complex w ciąży

Nie zaleca się stosowania leku Vicks AntiGrip Complex podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W

przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Vicks Antigrip Complex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed rozpoczęciem stosowania Vicks AntiGrip Complex należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje:

leki zawierające paracetamol lub inne leki zmniejszające przekrwienie stosowane podczas przeziębienia i grypy. W razie przyjmowania tych leków nie wolno stosować leku Vicks AntiGrip Complex.

inhibitory monoamino oksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Nie stosować leku Vicks AntiGrip Complex, jeśli pacjent stosował IMAO w ciągu ostatnich 14 dni.

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu depresji, takie jak amitryptylina lub imipramina.

leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe), w tym beta-adrenolityki, lub poprawiające czynność serca lub korygujące nieprawidłowy rytm serca (digoksyna, lanoksyna, digitoksyna).

fenotiazyny (stosowane jako leki przeciwpsychotyczne w celu leczenia stanów, takich jak schizofrenia lub paranoja, albo jako leki zapobiegające nudnościom i wymiotom).

leki przeciw nudnościom i przeciwwymiotne (np. metoklopramid lub domperidon).

leki zmniejszające krzepliwość (leki przeciwzakrzepowe), np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny.

leki obniżające wysokie stężenie cholesterolu (np. kolestyramina).

leki uspokajające (barbiturany).

probenecyd lub AZT (zydowudyna).

izoniazyd (stosowany w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek z następujących, poważnych działań, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i pilnie zwrócić się po pomoc medyczną:

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych. Rzadko występowały ciężkie reakcje alergiczne (anafilakcja), świszczący oddech lub problemy z oddychaniem. (Rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000 osób; Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób).

Bardzo rzadko podczas przyjmowania paracetamolu mogą wystąpić niektóre zaburzenia komórek krwi i trzustki (zapalenie trzustki) (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób)

Inne działania niepożądane

Częstość: Działania niepożądane

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób): Utrata apetytu, nudności lub wymioty

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000 osób): Łagodne reakcje alergiczne (takie jak wysypka skórna lub pokrzywka) Ból brzucha, biegunka Ból głowy, zawroty głowy Szybkie bicie serca (kołatanie serca); Wysokie ciśnienie krwi Trudności w zaspianiu (bezsennność), nerwowość, drżenie (drgawki), drażliwość, niepokój, dezorientacja lub lęk.