

# Zincas 5,5 mg 50 tabletek lek bez recepty Farmapol cynk



cena: 15,99 PLN

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Tabletki
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	zinci
Zastosowanie	Witaminy

## Opis produktu

### Opis

Zincas jest lekiem zawierającym cynk.

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

### Wskazania

Uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

Substancja czynna: Zinci hydroaspartas

### Skład

Jedna tabletkę zawiera:

5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodorooasparagianu

dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokryształiczna, żółcień chinolinowa (E 104).

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.



Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Wiek

Dawka leku

Stosować

dzieci w wieku do 5 lat

1 tabletką

1 raz na dobę

dorośli i młodzież w wieku od 5 do 15 lat

1 tabletką

2 razy na dobę

dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

1 tabletką

3 razy na dobę

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zincas:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

jeśli pacjent ma niewydolność nerek;

jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami.

Uwagi do stosowania

Zincas zawiera sacharozę. Jedna tabletką zawiera 30 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zincas zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Zawartość:

Lek Zincas ma postać żółtych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: FARMAPOL

Pozwolenie: MZ R/2636

Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

#### Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Zincas nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Zincas jednocześnie z następującymi lekami:

antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie;

zawierające kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna, polopiryna);

leki przeciwbólowe zwanymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna;

leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd;

kortykosteroidy, zwane sterydami, np. hydrokortyzon;

leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku;

substancje chelatujące, np. penicylamina – lek stosowany w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych. Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy. Długotrwałe stosowanie leku Zincas może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.